

17.2.2023

Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

18-vuotiaiden lasten ja nuorten psykoosilääkitystä selvittävässä tutkimuksessa (Dnro: 32/26/2018)

Artikkeli 1. Tutkimuksen löydösten mukaan Suomessa alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten psykoosilääkkeiden käytön aloitus on lähes kaksinkertaistunut vuosien 2008 (2.1 /1000 henkilöä) ja 2017 (3.8/1000 henkilöä) välisenä aikana, määrän kasvu oli suurinta 13-17-vuotiailla, käytönkasvu oli nopeampaa tytöillä kuin pojilla, vuosi 2011 oli käännekohta, jolloin tytöt ohittivat pojat psykoosilääkkeiden ensiostajien määrässä ja samana vuonna ketiapiini ohitti risperidonin yleisimpänä psykoosilääkkeenä.

Artikkeli 2. Psykoosilääkkeen käytön keskimääräinen kesto oli 509 päivää, kesto oli lyhyempi tytöillä kuin pojilla, ja ikäryhmissä 7-12 ja 13-15 verrattuna 1-6-vuotiaisiin, kesto oli lyhyempi ketiapiini-lääkityksen kuin risperidoni-lääkityksen aloittaneilla.

<https://doi.org/10.1080/08039488.2022.2042597>

Artikkeli 3. Tutkimusjakson aikana psykoosilääkkeitä käyttävistä henkilöistä 44,9% oli monilääkittyjä, monilääkitystä oli useammin tytöillä (55%) kuin pojilla (44.5%). Kaksi eniten yhdessä psykoosilääkkeen kanssa käytettäviä lääkkeitä olivat masennuslääkkeet (66%) ja stimulantit tai atomoksetiini (31%). Nuorilla oli suurentunut riski monilääkitykseen verrattuna alle 13-vuotiaisiin lapsiin. Psykostimulanttien tai atomoksetiinin ja masennuslääkkeiden käyttö ennen psykoosilääkettä nosti monilääkityksen riskiä (OR 8.39 [95% CI 7.49–9.41], OR 3.02 [95% CI 2.75–3.31]).